

Wat is een open provocatietest?

Een open provocatietest wordt gedaan bij kinderen die verdacht worden van een allergie voor een bepaald voedingsmiddel.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de Kind en jongerenafdeling van het Zaans Medisch Centrum.

Vorbereiding

Allergische reacties moeten zo goed als verdwenen zijn bij aanvang van de test. Ook eczeem moet goed behandeld zijn. 48 Uur voor aanvang van de test dient gestopt te worden met corticosteroiden. Drie dagen van te voren dient gestopt te worden met antihistaminica. Dit alles wordt poliklinisch met de arts afgesproken.

Als uw kind ziek is (geweest) met of zonder koorts in de week voor de test, kan de test mogelijk niet doorgaan. Ook bij toename van salbutamolgebruik of andere benauwdheidsklachten kan de test mogelijk niet doorgaan.

Dag van het onderzoek

Uw kind mag thuis een licht ontbijt nemen (bijv. een beschuitje en iets te drinken) en kan gedurende de test thee, verdunde limonade en water drinken. Hij/zij mag niets eten gedurende de test.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats tijdens een dagopname op de Kind en jongerenafdeling. Voor aanvang van de test wordt uw kind gezien door de arts en worden er controles gedaan. Vervolgens krijgt uw kind elke 30 minuten een grotere hoeveelheid van het voedingsmiddel toegediend. Voor elke gift wordt beoordeeld of uw kind heeft gereageerd op de vorige toediening. Uw inbreng is hierbij belangrijk. Tijdens de test mag uw kind thee, verdunde limonade en wat water drinken, maar niets eten.

Na de test blijft uw kind nog 2 uur om zeker te zijn dat uw kind geen reactie vertoont. Na deze 2 uur wordt uw kind nogmaals door de arts gezien. Het onderzoek is meestal rond 15.00 uur afgelopen.

Uw kind

Uw kind krijgt ieder half uur een grotere hoeveelheid voedingsmiddel. Er wordt begonnen met heel weinig wat steeds meer wordt tot uiteindelijk een "normale" portie. Uw kind mag

tijdens de test niet van de afdeling, maar kan (afhankelijk van de leeftijd) wel in de speelkamer spelen of op de kamer iets leuks doen.

Late reacties

Indien er thuis na de test een acute reactie optreedt (zwellings, galbulten, ongecontroleerd braken, benauwdheid), kunt u ten alle tijden contact opnemen met de Kind en jongerenafdeling.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts via een poli (bel) afspraak. Met de arts wordt besproken wat het resultaat is van de test en hoe verder om te gaan met dit voedingsmiddel.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de test dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de Kind en jongerenafdeling telnr. 075 650 7438.