

Wat is een dubbelblinde provocatietest

Een dubbelblinde provocatietest wordt gedaan bij kinderen die verdacht worden van een koemelkeiwitallergie. De symptomen van een koemelkeiwitallergie zijn erg a-specifiek. Koemelkeiwitallergie kan zich met een grote verscheidenheid aan klachten presenteren.



Waar vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek vindt plaats op de Kind en jongerenafdeling van het Zaans Medisch Centrum.

Vorbereiding

Uw kind mag thuis i.p vier weken geen koemelkeiwit hebben gehad. Tijdens deze periode zal een koemelk vrije voeding gedronken worden. Allergische reacties moeten zo goed als verdwenen zijn bij aanvang van de test. Ook eczeem moet goed behandeld zijn. 48 Uur voor aanvang van de test dient gestopt te worden met corticosteroiden. Een week vooraf dient gestopt te worden met antihistaminica. Dit alles wordt poliklinisch met uw kinderarts afgesproken.

Dag van het onderzoek

Uw kind mag thuis een licht ontbijt nemen (bijv. een beschuitje en iets te drinken). Indien uw kind flesvoeding krijgt, dan een halve fles zo vroeg mogelijk (6 à 7 uur in de ochtend) geven.

De test wordt gedaan met de eigen voeding, daarom willen wij u vragen om een nieuw blik/pak zuigelingenvoeding mee te nemen, indien uw kind dit gebruikt. Deze voeding wordt gebruikt voor de test.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats tijdens 2 dagopnames waar minimaal 1 week tussen zit. Het is heel belangrijk dat u beide testdagen komt. Als de tweede testdag niet gedaan wordt, kan er niet worden bepaald of uw kind een koemelkeiwitallergie heeft. Dit kan problemen geven bij de vergoeding van koemelkeiwitallergie.

In willekeurige volgorde krijgt uw kind op één testdag placebovoeding (eigen voeding, koemelkvrij) en op één testdag een verumvoeding (eigen voeding, koemelkvrij met Protifar = koemelktoevoeging). Dubbelblind betekent dat u, de verpleegkundige en de

arts niet weet welke voeding er op welke dag gegeven wordt. Dit wordt pas bekend op de poli.

Voor aanvang van de test wordt uw kind nagekeken door de zaalarts. Vervolgens krijgt uw kind elke 30 minuten een grotere hoeveelheid te drinken. Gedurende de hele test wordt uw kind regelmatig gecontroleerd op reacties op de voeding. Tijdens de test mag uw kind niets eten en alleen water, thee of limonade drinken. Het is wel aan te raden om niet te veel drinken aan uw kind te geven om te voorkomen dat de testvoeding niet wordt opgedronken. 30 minuten na inname van de laatste testvoeding mag uw kind weer normaal eten en drinken. Let hierbij op dat u geen nieuwe producten aan uw kind geeft.

Na de test blijft uw kind nog 2 uur om zeker te zijn dat uw kind geen reactie vertoont. Binnen deze 2 uur wordt uw kind nogmaals door de zaalarts nagekeken.

Het onderzoek is rond 14.00 uur afgelopen. Bij ontslag krijgt u een formulier mee. Hierop houdt u een week aansluitend aan de testdag bij of uw kind nog late reacties vertoont.

Uw kind

Op de Kind en jongerenafdeling is een pedagogisch medewerker aanwezig om uw kind indien nodig te ondersteunen en begeleiden tijdens het onderzoek.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts via een poli (bel) afspraak.

Indien u een poli afspraak heeft, gelieve de registratieformulieren meenemen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de test dan kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met de Kind en jongerenafdeling.

Telefoonnummer: 075 650 7438.