

Een Glucosetolerantie-test is een onderzoek waarbij gekeken wordt of glucose bij uw kind op de juiste wijze in het lichaam verwerkt wordt. Tijdens deze test wordt op gezette tijden bij uw kind bloed afgenomen nadat er eenmalig glucose is gedronken. Het bloed wordt vervolgens in het laboratorium onderzocht. Tijdens het onderzoek wordt ook een aantal maal de bloeddruk van uw kind gemeten.

Waar vindt (het onderzoek) plaats

Het onderzoek vindt plaats op de Kind en jongerenafdeling van het Zaans Medisch Centrum.

Vorbereiding

Dag voor het onderzoek

Voor dit onderzoek moet uw kind nuchter zijn. Uw kind mag dus vanaf 24.00 uur op de avond voor het onderzoek niets meer eten (ook geen snoep of kauwgom) of drinken (water mag wel, maar dit mag geen limonade of suiker bevatten).

Dag van het onderzoek

Indien u een recept heeft gekregen voor Emla®, brengt u, 45 minuten voordat u bij ons op de afdeling moet zijn, een kleine hoeveelheid zalf ter grootte van een knikker aan op de afgesproken plaatsen bij uw kind en u dekt dit af met een van de doorzichtige pleisters. Als de plaats niet is afgesproken, brengt u de zalf en pleisters aan op de handruggen van uw kind.



De zalf zorgt ervoor dat het infuus prikken / bloedafname minder pijnlijk is. Indien uw kind medicijnen gebruikt, moet in overleg met de arts, worden bepaald of deze wel of niet ingenomen kunnen worden.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats tijdens een dagopname. Bij binnenkomst op de Kind en jongerenafdeling wordt uw kind voorbereid door de medisch pedagogisch zorgverlener op het onderzoek. Bij afwezigheid van een pedagogisch medewerker wordt dit door een kinderverpleegkundige gedaan. Tijdens de test mag uw kind alleen water drinken.

De kinderarts kan kiezen voor een **lang** of een **kort** onderzoek:

1. Lang

Uw kind krijgt een infuus ingebracht door de arts en er wordt bloed afgenomen. Hierna moet uw kind eenmalig glucose drinken. Daarna wordt er na 30 minuten weer bloed afgenomen via het infuus door de verpleegkundige. Dit herhaalt zich na 60, 90 en 120 minuten. In totaal wordt 5 keer bloed afgenomen via het infuus.

Uw kind hoeft tijdens de test geen bedrust te houden. Als bijwerking kan misselijkheid optreden. Het onderzoek is rond 12.00 afgelopen. Uw kind kan, na het eten van een broodje, naar huis. Er is geen verdere nazorg noodzakelijk.

2. Kort

Bij uw kind wordt bloed afgenomen door de arts via een bloedvat. Hierna moet uw kind eenmalig glucose drinken. Na 2 uur wordt er bloed afgenomen door de verpleegkundige via een vingerprik. Uw kind hoeft tijdens de test geen bedrust te houden. Als bijwerking kan misselijkheid optreden. Het onderzoek is rond 12.00 afgelopen. Uw kind kan, na het eten van een broodje, naar huis. Er is geen verdere nazorg noodzakelijk.

Uw kind

1. Lang

Het infuus inbrengen is vervelend, daarom krijgt u Emla® mee om de pijn te verzachten. Het voordeel van het infuus is dat er daarna via het infuus bloed afgenomen kan worden zonder dat uw kind (nogmaals) geprikt wordt. Het bloed afnemen is niet pijnlijk.

Tussendoor kan uw kind tv kijken, lezen, spelletjes doen, enz.

Als ouder/verzorger mag u overal bij aanwezig zijn.

2. Kort

De bloedafname is vervelend, daarom krijgt u Emla® mee om de pijn te verzachten.

Maar i.p. is dit eenmalig. De vingerprik is minder erg.

Tussendoor kan uw kind tv kijken, lezen, spelletjes doen, enz.

Als ouder/verzorger mag u overal bij aanwezig zijn.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts. Deze vertelt u ook wanneer en hoe u de uitslag krijgt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de Glucosetolerantietest dan kunt u contact opnemen met de Kind en jongerenafdeling telnr.: 075 650 7438.