

Erectiestoornissen vormen een veel voorkomend probleem. De oorzaak verschilt echter van persoon tot persoon. Spanningen kunnen een rol spelen maar bijvoorbeeld ook een te geringe bloed-instroom of een te snelle bloed-uitstroom. Uw arts heeft u naar aanleiding van uw klachten Androskat voorgeschreven. In dit formulier treft u uitgebreide informatie aan over Androskat.

### **Welke bijwerkingen kan Androskat geven?**

Als gevolg van de injectie zijn de volgende bijwerkingen gemeld: bloeduitstorting, verdoofd gevoel in de penis, roodheid van de injectieplaats, voorbijgaande pijn en zwelling van de voorhuid en duizeligheid. Raadpleeg uw arts als deze verschijnselen langere tijd aanhouden. Bij regelmatig gebruik gedurende een langere periode kan een plaatselijke verharding ontstaan. Neem in dit geval contact op met uw arts.

### **Waar moet u op letten?**

Gebruik van Androskat kan in enkele gevallen leiden tot erecties die langer duren dan wenselijk. Indien de erectie langer dan 3 uur aanhoudt, dient u contact op te nemen met uw arts of zijn plaatsvervanger (ook 's nachts). Er kan namelijk een zuurstoftekort in de penis ontstaan, waardoor het weefsel beschadigt. Dit is een ernstige situatie die snel moet worden behandeld. Bij een verkeerde injectietechniek kan de vloeistof onderhuids terechtkomen. Androskat is dan niet of minder werkzaam en er kan pijn optreden. Indien dit vaker voorkomt, dient u contact met uw arts op te nemen om de injectietechniek te oefenen. Voorkom te prikken in zichtbare bloedvaten of in de onderkant van de penis (hier loopt de plasbuis) omdat hierdoor bloedingen op kunnen treden. Om de kans op het ontstaan van verhardingen in de penis te voorkomen wordt aanbevolen Androskat niet vaker dan 1 keer week te gebruiken. Met name het afwisselend links en rechts injecteren is hierbij belangrijk. Bij langdurig gebruik is regelmatige controle door de arts gewenst. Wanneer u gelijktijdig middelen gebruikt die de bloedstolling vertragen, dient de injectieplaats gedurende tenminste 3 minuten te worden dichtgedrukt.

### **Samenstelling**

1 ampul à 2ml Androskat bevat 30 mg papaverinehydrochloride en 1 mg fentolaminemesylaate. Hoe werkt Androskat? De werkzame bestanddelen van Androskat zorgen voor een verwijding van de bloedvaten en een verslapping van de spieren in het zwellichaam van de penis. Hierdoor stroomt er meer bloed in het zwellichaam, waardoor er een erectie kan ontstaan. De werking treedt vrijwel onmiddellijk in en is maximaal na ongeveer 15 minuten. De duur van de erectie is afhankelijk van de dosering en de oorzaak van de erectiestoornis.

### **Voor wie is Androskat bestemd?**

Androskat kan gebruikt worden bij onderzoek naar de oorzaak van erectiestoornissen of bij de behandeling van erectiestoornissen.

### **Voor wie is Androskat niet bestemd?**

Androskat niet gebruiken indien u lijdt aan:

- andere aandoeningen van de penis, zoals b.v. kromstand door M. Peyronie, ontstekingen en plaatselijke verhardingen
- hartritmestoornissen en ernstige hartziekten
- een bepaalde vorm van bloedarmoede (sikkelcelanemie)
- ernstige lever- of nierziekten
- overgevoeligheid voor bestanddelen van Androskat
- voorzichtigheid is geboden wanneer u lijdt aan verhoogde oogboldruk (glaucoom) en aandoeningen waarbij bloeddrukdaling ongewenst is, zoals b.v. verlaagde bloeddruk of bij medicijnen die de bloeddruk verlagen.

### **Overdosering**

Het belangrijkste risico bij het toedienen van een te hoge dosering is het risico op een te lang durende erectie. Indien een erectie langer dan 3 uur aanhoudt dient u direct een arts te waarschuwen. In enkele gevallen treedt duizeligheid op. Dit kan een nadelige invloed hebben op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

### **Androskat samen met andere geneesmiddelen, roken en alcohol**

Indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt, vertelt u dit dan aan uw arts. Androskat kan de werking van geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen versterken. Roken vanaf een uur voor de injectie wordt afgeraden omdat dit de werking negatief kan beïnvloeden. Alcohol kan de werking versterken zodat de kans op een te lang durende erectie toeneemt. Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt dan ook ontraden.

### **Welke dosering moet u gebruiken?**

De dosering voor de behandeling van de erectiestoornis is afhankelijk van de oorzaak en varieert doorgaans van 0,1 tot 2 ml. Begin met 0,2 ml en bouw op in stapjes van 0,2 ml. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen en wijzigt u niets zonder overleg met uw arts. De maximale dosering bedraagt 2 ml per keer. Indien een injectie niet tot het gewenste resultaat leidt, mag u de injectie niet direct herhalen. Ook niet bijspuiten. Bij ontstaan van erectie langer dan 3 uur contact opnemen met huisartsenpost of uroloog.

### **Gereedmaken van de injectiespuit**


Het gereedmaken van de spuit en het injecteren dient bij voldoende licht uitgevoerd te worden. Zorg ook voor een schoon en hard oppervlak, zonder rommel. Neemt u de tijd voor deze handelingen. Let op een goede hygiëne, was uw handen en de penis goed met zeep voordat u gaat injecteren. Voer onderstaande procedure alleen uit indien deze duidelijk uitgelegd en voorgedaan is door uw arts.

- Tijdens het klaarmaken van de spuit hygiënisch werken. De naalden niet met de vingers aanraken.
- De lange naald, de opzuignaald, op de injectiespuit plaatsen.
- Eventuele vloeistof in het bovenste gedeelte van de ampul naar beneden tikken.

- De ampul openbreken bij het smalle deel van de hals. Houdt de duim op het stipje. Gebruik eventueel een zakdoekje om snijwonden te voorkomen.
- De ampul goed rechtop houden tijdens het openbreken.
- De huls van de opzignaald verwijderen, naald in de ampul steken en de injectievloeistof opzuigen in de injectiespuit. Vermijd opzuigen van lucht.
- Beschermhuls weer op de naald zetten en de naald van de spuit verwijderen.
- Plaats de korte injectienaald op de spuit. Verwijder de huls van de injectienaald.
- De injectiespuit met de naald naar boven houden en enkele malen met de nagel tegen de spuit tikken, om de luchtbellen te laten opstijgen. Vervolgens de spuit zover leegdrukken dat de voorgeschreven dosering in de spuit achterblijft.

### Het toedienen van de injectie

- Penis eerst opwrijven en zo dicht mogelijk tegen de buikwand vastpakken tussen duim en wijsvinger, zodanig dat de huid erover heen spant.
- Selecteer een stukje huid waar geen bloedvaten zichtbaar zijn. Dit is bij voorkeur 4 tot 5 mm links of rechts vanaf de zijkant van de penis, vlakbij de buikwand. Hierdoor wordt beschadiging van zenuwen of de urineleider voorkomen. Reinig de injectieplaats met behulp van een alcoholvatje.
- Houd de injectiespuit vast als een pen c.q. dartpijlje. Plaats de naald loodrecht op de injectieplaats.
- Druk de naald (tot aan het plastic) door de huid in het zwellichaam. Hierbij moet door een weerstand worden geprikt.
- Naald stukje terugtrekken, vingers laten verslappen en in één keer langzaam de oplossing volledig injecteren. Daarbij moet geen weerstand gevoeld worden. Indien u wel weerstand voelt, trekt u de naald 1 tot 2 mm terug en injecteert u opnieuw. Indien u nog steeds weerstand voelt, moet u de naald uit de penis trekken en controleren op verstopping door er een druppel uit te spuiten. Daarna kunt u de injectie opnieuw, zoals hierboven beschreven, uitvoeren.
- Als de spuit volledig leeg is, trek dan de naald uit de penis en druk de injectieplaats tenminste 2 minuten dicht. Tegelijkertijd moet de penis licht worden gemasseerd om de vloeistof te verdelen.



### Bewaring en houdbaarheid

Androskat bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °Celsius) in de originele verpakking op een donkere plaats. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter de aanduiding “niet te gebruiken na” en op de ampul na de aanduiding “exp”. De eerste twee cijfers geven de maand aan; de laatste twee cijfers het jaartal. Buiten het bereik van kinderen houden.

### Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen uw arts of apotheker.