

Spataderen

Gezonde aderen zorgen voor bloedafvoer vanuit het been. Spataderen ontstaan door slecht sluitende kleppen in de aderen. Hierdoor kan het bloed vanuit de benen niet goed genoeg terug naar het hart stromen. Dit zorgt voor stuwingsdruk in de (spat)aderen. Spataderen kunnen pijn en vermoeidheid in de benen geven, evenals nachtelijke kuitkramp.

VNUS Closure procedure

Er zijn verschillende methoden om spataderen te behandelen. De VNUS Closure® procedure is een vrij nieuwe methode bij het behandelen van spataderen. Deze methode is mogelijk ter vervanging van de stripoperatie. De ader moet echter wel geschikt zijn voor de nieuwe techniek. Door middel van Duplexonderzoek (echo) kan worden bepaald of dit het geval is.


Bij een VNUS Closure procedure® wordt via een klein sneetje in de huid (2 mm) ter hoogte van de knie een katheter in de spatader geplaatst. Met de Duplex / echo wordt vervolgens de juiste positie van de katheter bepaald. Hierna wordt vocht ingebracht rond de spatader door middel van een aantal injecties. Dit vocht dient als koeling en bevat een verdovend middel. Nadat de ader is verdoofd, wordt door hoogfrequente radiogolven (RFO) het uiteinde van de katheter licht verhit tot maximaal 120 graden Celcius. Hierdoor krimpt de vaatwand en sluit de ader. De katheter wordt nu voorzichtig teruggetrokken. Als de spatader is gesloten, wordt het bloed omgeleid via andere, gezonde aderen. In principe is het wondje te klein om te hechten.

Elastische kous


Tijdens uw polikliniekbezoek zal er een kous worden aangemeten. U hoeft zelf niets te regelen. De kous wordt na de ingreep bij u aangetrokken en u moet de kous tot 48 uur na de ingreep dragen.



Katheter wordt geplaatst in de ader



De ader wordt verhit en de aderwand krimpt



Katheter wordt verwijderd en de ader sluit

Let op!

Op de dag van de behandeling mag u de benen niet insmeren met een crème of bodylotion. De arts markeert namelijk de plaatsen waar gespoten wordt met een pen.

Bloedverdunners

U mag **Ascal** (Acetylsalicylzuur) blijven slikken.

U moet **3 dagen** voor de ingreep stoppen met het slikken van **Acenocoumarol** of **Sintrom**.

Na de behandeling

Na de ingreep krijgt u gedurende 24 uur een witte elastische kous. U krijgt het advies om regelmatig te lopen. Maar vermijd u zoveel mogelijk langdurig staan en zware lichamelijke inspanning. Na de behandeling kunt u uw dagelijkse activiteiten na een dag weer hervatten.

Waar?

De behandeling vindt over het algemeen poliklinisch plaats op onze poliklinische operatiekamers, locatie Noord 4.2. In enkele gevallen wordt de behandeling in dagopname gedaan.

Complicaties

Complicaties komen vrij zelden voor. Blauwe plekjes van de prikken voor de verdoving of pijn in het behandelde traject zijn normaal. Erg slanke patiënten kunnen gedurende een periode een soort streng voelen in het behandeltraject, dit verdwijnt uiteindelijk. Een kleine groep patiënten krijgt na de behandeling tromboflebitis (aderontsteking) klachten.

Dit kan geen kwaad en verdwijnt vanzelf. Het kan dan nuttig zijn de steunkous wat langer te dragen. Tegen de pijn kunt u paracetamol innemen.

Vragen?

U mag altijd contact opnemen met onze polikliniek.

Hart-vaatcentrum: tussen 08.00-17.00 op nummer 075 650 13 00 (via het Klantcontactcentrum)

Spoeisende Hulp: dag en nacht op nummer 075 650 26 00