

Spataderen

Gezonde aderen zorgen voor bloedafvoer vanuit het been. Spataderen ontstaan door slecht sluitende kleppen in de aderen. Hierdoor kan het bloed vanuit de benen niet goed genoeg terug naar het hart stromen. Dit zorgt voor stuwing en druk in de (spat)aderen. Spataderen kunnen pijn en vermoeidheid in de benen geven.

VNUS Closure procedure

Er zijn verschillende methoden om spataderen te behandelen. De VNUS Closure procedure is een nieuwe methode bij het behandelen van spataderen. Deze methode is mogelijk ter vervanging van de stripoperatie door de chirurg. Dit hangt af of de ader geschikt is voor de nieuwe techniek.

Bij een VNUS Closure procedure wordt via een klein sneetje in de huid (2 mm) ter hoogte van de knie een katheter in de spatader geplaatst. Met een echo wordt vervolgens de juiste positie van de katheter bepaald. Nadat de ader is verdoofd, wordt door hoogfrequente radiogolven (RFO) het uiteinde van de katheter licht verhit tot maximaal 120 graden Celcius. Hierdoor krimpt de vaatwand en sluit de ader. De katheter wordt nu voorzichtig teruggetrokken. Als de spatader is gesloten, wordt het bloed omgeleid via andere, gezonde aderen.

Elastische kous

Tijdens uw polikliniekbezoek zal er een kous worden aangemeten die u mee dient te nemen op de dag van de ingreep. Deze kous zal tot ongeveer 24 uur na de behandeling gedragen moeten worden.

Voor de behandeling

Bloedverduuners Ascal (acetylsalicylzuur) en Clopidogrei (grepid) mag u doorgebruiken. Het gebruik van andere bloedverduuners moet u bespreken met uw arts.

Let op!

Op de dag van de behandeling mag u uw benen niet insmeren met een crème of bodylotion. De arts markeert namelijk de plaatsen waar gespoten wordt met een pen.

Behandeling klinisch

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de voor u geplande verpleegafdeling. Nadat u bent ingeschreven en voorbereid, wordt u naar de operatieafdeling gebracht. Daar wordt u naar de ontvangstruimte gebracht alwaar de anaesthesist de verdoving zal toedienen. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Behandeling poliklinisch

De behandeling vindt plaats op locatie Noord 4-2. Daar mag u zich melden bij de poliklinische operatiekamers.

Tijdens de ingreep maakt de chirurg een kleine snede in de huid net onder de knie, en wordt de closure katheter in de spatader geplaatst. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. Met de echo wordt vervolgens de juiste positie van de katheter bepaald. Hierna wordt rond de spatader vocht ingebracht, wat dient als koelvloeistof.

Dit vocht wordt door middel van ongeveer 10 prikjes toegediend en bevat ook een plaatselijk verdovend middel.

Na de behandeling

Na de ingreep krijgt u gedurende anderhalve dag een witte elastische kous. U krijgt het advies om regelmatig te lopen maar langdurig staan en zware lichamelijke inspanning zoveel mogelijk te vermijden. Na de behandeling kunt u uw dagelijkse activiteiten na een dag weer hervatten. Bij uw ontslag krijgt u een afspraak mee voor een nacontrole bij de chirurg.

Complicaties

Complicaties komen vrij zelden voor.

Soms wat blauwe plekjes van de prikken voor de verdoving, soms pijn in het behandelde gebied. U kunt bij pijn paracetamol innemen. Erg slanke patiënten kunnen gedurende een periode een soort streng voelen in het behandelde gebied, dit verdwijnt uiteindelijk. Een kleine groep patiënten krijgt na de behandeling tromboflebitis (aderontsteking) klachten. Dit kan geen kwaad en verdwijnt vanzelf. Het kan dan nuttig zijn de steunkous wat langer te dragen.

Vragen?

U mag altijd contact opnemen met onze polikliniek.

- De polikliniek is van 08.30-16.30 uur te bereiken op 075 650 12 15
- De Spoedeisende Hulp is dag en nacht te bereiken op 075 650 26 00