

U heeft vandaag een ERCP ondergaan. Onderstaande informatie is belangrijk voor ná het onderzoek.

Symptomen

- Het is normaal dat uw keel wat gevoelig is na de behandeling, dit gevoel zakt in de loop van de dag af.
- Het is mogelijk dat u last heeft van milde buikklachten en een opgeblazen gevoel na het onderzoek. U kunt thuis zo nodig paracetamol hiervoor innemen.

Bijzonderheden

- U mag de gehele dag niet meer zelfstandig deelnemen aan het verkeer.
- Het is belangrijk dat u wordt opgehaald vanuit het ziekenhuis.
- Tot 1 uur na het onderzoek mag u niets eten of drinken. Als u goed wakker bent, zich goed voelt en geen/weinig buikpijn heeft, mag u weer rustig beginnen met eten en drinken. Begin met wat water of thee. Als dit u dit goed kunt verdragen en geen pijnklachten heeft, mag u beginnen licht verteerbaar voedsel en dit langzaam uitbreiden tot uw normale dieet. Rekent u erop dat u de volgende dag weer uw normale dieet kunt vervolgen.

Controle

In principe heeft u al een afspraak staan voor controle bij de arts, tenzij de arts vooraf met u besproken heeft dat dit niet nodig is.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

- Bij koorts, een temperatuur hoger dan 38,5 °C in de eerste 48 uur.
- Indien u na afloop van het onderzoek thuis klachten krijgt van misselijkheid, toenemende buikpijn, bloedverlies bij de ontlasting, pijn op de borst of niet goed kunnen slikken of doorademen raden wij aan om direct contact op te nemen met het ziekenhuis.

Bij (overige) problemen of vragen kunt u ook contact opnemen met het ziekenhuis

- Tussen 8:00-16:00 uur scopie afdeling op 075 650 72 89
- Buiten kantoortijden afdeling Spoedeisende Hulp op 075 650 26 00