

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling cardiologie. Meldt u zich 30 minuten voor de afgesproken tijd bij de balie op de 2e etage, locatie 2.12. U wordt opgehaald door een verpleegkundige.

Vorbereiding

Tijdens het onderzoek mag er geen voedsel in de maag zijn. U mag daarom tot 6 uur voor het onderzoek uw medicijnen nemen en iets lichts eten (een witbroodje of beschuitje met jam en een kopje thee). Daarna mag u niets meer eten en drinken tot het onderzoek.

Het onderzoek

Er wordt door de verpleegkundige een infuus geplaatst in de ader van de arm. U wordt aangesloten aan de monitor die uw hartritme registreert tijdens de behandeling.

Bij een slokdarnecho kijkt een cardioloog met een buigzame slang vanuit de slokdarm naar het hart. De slokdarnecho wordt uitgevoerd door de cardioloog in samenwerking met de echocardiografist en de anesthesie medewerker.

Als u een gebitsprothese of een plaatje heeft, wordt u gevraagd dit te verwijderen. U krijgt een bijtring ter bescherming van de slang.

De anesthesie medewerker dient via het ingebrachte infuus een medicijn toe, waardoor u kortdurend in slaap valt. U ligt op uw linkerzij als de cardioloog de slang via uw keel naar de slokdarm brengt. Op de slang zit een verdovend gel.

Vanuit de slokdarm zijn de structuren van het hart beter zichtbaar. De werking van de hartspier en de kleppen van het hart worden bekeken.

Na het onderzoek

Na het onderzoek verblijft u op de afdeling cardiologie totdat u weer goed wakker bent. Een uur na het onderzoek mag u een paar slokjes water nemen. Gaat het slikken niet goed, dan moet u een kwartier wachten en kunt u opnieuw een paar slokjes water nemen. Gaat het slikken goed, dan kunt u weer eten. Na het onderzoek mag u de eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer en geen gevaarlijke machines besturen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 20-30 minuten. Na het onderzoek verblijft u ongeveer 1,5 uur op de afdeling.

Uitslag

De cardioloog beoordeelt uw echo. Uw behandelend cardioloog zal de bevindingen met u bespreken tijdens uw eerstvolgende polikliniekbezoek.

Mogelijke complicaties

Een slokdarmecho is een veilig onderzoek met weinig risico's. In zeer zeldzame gevallen komen er complicaties voor, zoals beschadiging van de keelholte/slokdarm met wat bloedverlies tot gevolg. Ook kunt u last krijgen van slikklachten door de verdoving.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze informatie en/of het onderzoek nog vragen hebben dan kunt u bellen naar het Hartvaatcentrum op telefoonnummer 075 650 1300.