

Inleiding

Uw pijnspecialist adviseert U een blokkade van de sympathische grensstreng op lumbaal niveau. Deze behandeling wordt toegepast bij (neuropathische) zenuwpijnen in rug en benen en bij doorbloedingsstoornissen. Soms wordt deze behandeling toegepast bij een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS type I) van het been.

Behandeling

De lumbale sympathicus blokkade heeft als doel met behulp van één of meerdere naalden het onwillekeurige (sympathische) zenuwstelsel te blokkeren. Dit zenuwstelsel loopt aan weerszijde van de voorkant van de wervelkolom ter hoogte van de lendenwervels. Bij de lumbale sympathicus blokkade brengen we onder röntgendoorlichting, na plaatselijke verdoving, de naald(en) in de rug in. Met röntgencontrastvloeistof wordt de juiste positie van de naald(en) gecontroleerd. Dan schakelen we de zenuwbaan tijdelijk (met een plaatselijk verdovingsmiddel) of langdurig uit. De langdurige uitschakeling vindt plaats met een neurolytisch middel of met een RF-thermolesiebehandeling. Zo ontstaat er een verbetering van de doorbloeding in been en voet en in veel gevallen treedt pijnvermindering op.

Resultaat

Pas na twee tot drie maanden kunt u het optimale resultaat van de RF-behandeling verwachten. Mogelijk merkt u wel eerder verbetering van de pijnklachten. Soms is een andere behandeling noodzakelijk.

Bijwerkingen en complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Toch bestaat er een geringe kans op het optreden van complicaties:

- Als mogelijke bijwerking kan er tijdelijk een zwelling optreden van het been en/of de voet, omdat de doorbloeding van het been sterker is dan voor de behandeling.
- Ook kan duizeligheid ontstaan indien uit liggende houding snel overeind komt.
- Indien u allergisch bent voor röntgencontrastvloeistof, kunt u jeuk en huiduitslag krijgen of kortademig worden. In zeldzame gevallen leidt dit tot een ernstige bloeddrukdaling.
- Tevens is er kans op het optreden van nieuwe zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en het bovenbeen. Deze klachten verdwijnen meestal vanzelf in de loop van enkele weken. U kunt hiertegen een pijnstiller innemen.
- Indien bij mannen de blokkade tweezijdig wordt uitgevoerd kan (tijdelijk) impotentie ontstaan.

Vragen??

Op de website kunt u een overzicht vinden van de vragen die vaak aan ons worden gesteld.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan kunt u:

- Een mail sturen
- Een bericht via BeterDichtbij App sturen, mits u hier al voor bent aangemeld
- Telefonisch contact opnemen. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Belangrijk: Indien u het antwoordapparaat te horen krijgt, luistert u dan het gehele bandje af. U krijgt dan de benodigde informatie over het telefonisch spreekuur

Contactgegevens

Pijncentrum Zaans Medisch Centrum

Koningin Julianaplein 58

1500 EE Zaandam

Emailadres: pijncentrum@zaansmc.nl

Telefoonnummer: 075 6507906