


Wat zijn transperineale bipten?

U krijgt een prostaatbiopsie. Bij een prostaatbiopsie worden stukjes weefsel uit de prostaat gehaald met een holle naald. Zo'n stukje weefsel heet een bipt. De biopsie doen we gelijktijdig met een echografie. We doen dit onderzoek om te kijken of u prostaatkanker heeft of dat het gaat om een goedaardige vergroting of een ontsteking van de prostaat.

Het prostaatbipt wordt transperineaal gedaan. Dit betekent dat er via de huid tussen de anus en de balzak (ook wel perineum genoemd) met een naald wordt geprikt. Dit is een nieuwe techniek waarmee de arts beter bij de prostaat kan komen. Hierdoor is de kans kleiner dat de arts kankercellen mist. Bovendien is de kans op infectie klein zodat u geen antibiotica nodig heeft.



Ter voorbereiding op het onderzoek

Slikt u bloedverdünnende medicijnen? U moet hier ruim voor het onderzoek mee stoppen.

- Stop 7 dagen voor het onderzoek met Persantin (Dipyridamol), Plavix (Clopidogrel).
- Stop 5 dagen voor het onderzoek met Marcoumar (Fenprocoumon)
- Stop 3 dagen voor het onderzoek met Acenocoumarol (Sintrom).
- Stop 2 dagen voor het onderzoek met Apixaban, Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa), Lixiana (Edoxaban)
- Carbasalaatcalcium, Acetylsalicylzuur en Aspirine mag u blijven gebruiken.

Wordt het onderzoek onder sedatie (narcose) gedaan? Dan wordt u opgenomen op de afdeling Dagopname (4 hoog). U moet dan nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf een bepaald tijdstip niet meer mag eten en drinken. U krijgt van tevoren te horen vanaf welke tijdstip dit is.

Het onderzoek

- U trekt uw onderkleding en schoenen uit. Daarna gaat u op een onderzoekstafel liggen met uw benen in de beensteunen.
- De arts voelt dan eerst via de anus naar uw prostaat. De huid tussen de balzak en de anus wordt verdoofd met een dun naaldje. Deze prik geeft een branderig gevoel.
- Daarna brengt de arts een echoprobe in via de anus. Dit is niet pijnlijk maar kan een beetje onaangenaam aanvoelen. Het is belangrijk dat u zo goed mogelijk ontspant. Met de echoprobe wordt de prostaat in beeld gebracht zodat we de prostaat op het beeldscherm goed kunnen bekijken. Hierdoor kunnen we precies bepalen waar de bipten genomen moeten worden.
- Daarna wordt de prostaat verdoofd met twee prikken. De verdovingsprikken kunnen even pijnlijk zijn.
- De arts zal daarna met een holle naald meerdere stukjes weefsel uit de prostaat nemen. Hier heeft u door de verdoving weinig last van. U hoort hierbij een klikkend geluid.

Na het onderzoek

- De arts bespreekt met u wanneer u weer mag beginnen met de bloedverdunnende medicijnen.
- Na het onderzoek kunt u meteen naar huis.
- De eerste 3 dagen na het onderzoek mag u niet fietsen of andere activiteiten doen waarbij u op een zadel zit. Rijd ook niet na het onderzoek zelf naar huis met de auto. U kunt wel met het openbaar vervoer naar huis.
- Plassen kan tijdelijk wat moeilijker gaan.
- De eerste twee weken na het onderzoek kan er een beetje bloed in de urine te zien zijn. In het sperma kan wel tot drie maanden na het onderzoek bloed te zien zijn. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Wanneer moet u wel een arts raadplegen?

- Als u koorts heeft (38,5 graden celcius of hoger)
- Als u niet meer kunt plassen
- Als u na een week nog steeds vaker moet plassen of pijn heeft bij het plassen

De uitslag

Het afgenomen weefsel wordt onderzocht door de patholoog. Tijdens de vervolgspraak zal uw uroloog de uitslag met u bespreken. Dan hoort u ook of er meer onderzoek nodig is.

Vragen?

polikliniek Urologie (via het Klantcontactcentrum): 075 650 1290
maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 16.30 uur

Spoedeisende Hulp: 075 650 2600
buiten bovenstaande tijden