

De uroloog heeft met u afgesproken dat u zelf blaasspoelingen met Gentamicine (antibiotica) gaat uitvoeren. Dit gebeurt omdat uw blaasinfecties niet reageren op tabletten.

Benodigheden

- Gentamicine 40 mg/ml, ampul 2 ml (totaal 80 mg per keer)
- Zakje NaCl 0,9% (50 ml)
- Opzuignaaldjes en spuitjes
- Katheters

De recepten voor Gentamicine, spuiten en naalden zijn naar uw apotheek gestuurd. Katheters en NaCl-zakjes zijn via de Medisch Speciaalzaak besteld en worden bij u thuis bezorgd.

Schema blaasspoelingen

- Eerste 2 weken: 1 keer per dag.
- Daarna 10 weken: om de dag.
- Laatste 12 weken: 2 keer per week.

De zorgverlener kan met u een ander schema afspreken.

De oplossing (50 ml) brengt u bij voorkeur in de avond in. Deze mag tot de volgende ochtend in de blaas blijven. U plast de vloeistof daarna zelf uit.

De standaard behandelduur is 6 maanden. Tijdens de behandeling bekijkt de zorgverlener steeds of doorgaan nodig is of dat eerder stoppen kan.

Werkwijze (zie figuur 1)

- Plaats de opzuignaald op de spuit.
- Trek met de spuit de Gentamicine op uit de ampul.
- Spuit de Gentamicine via **1** in het NaCl-zakje.
- Verwijder de lege spuit en naald.
- Zet het klemmetje boven **2** dicht. Verwijder daarna het dopje van **2**.
- Sluit het zakje via **2** aan op de katheter. Druk goed aan, zodat er geen vloeistof langs de katheter loopt.
- Zet het klemmetje boven **2** weer open. Knijp voorzichtig in het zakje, zodat de vloeistof in de blaas stroomt.

Als het zakje leeg is, zet u het klemmetje boven **2** weer dicht. Verwijder daarna de katheter en het zakje.



Curion curiflush blaasvloeistof NaCl 0,9%

Figuur 1

- Via **1** spuit u de Gentamicine in het zakje.
- Het klemmetje onder het zakje en boven **2** moet eerst dicht staan.
- Het blauwe dopje bij **2** verwijdert u en sluit u stevig aan op de katheter.
- Door voorzichtig in het zakje te knijpen, komt de vloeistof in de blaas.

Mogelijke complicaties

- Blaasontsteking: bij milde klachten zonder koorts kunt u doorgaan met spoelen.
- Koorts boven 38,5°C en/of koude rillingen: neem contact op met de polikliniek (zie contactgegevens).

Contact

- Vragen of klachten vóór 16.30 uur: polikliniek Urologie via het Klantcontactcentrum: **075 650 1290**
- Dringende vragen na 17.00 uur, in de nacht of in het weekend: huisartsenpost: **075 653 3000**
- Bij spoed: Spoedeisende Hulp: **075 650 2600**