

U bent opgenomen geweest voor een botoxbehandeling van de blaas. Deze informatie kunt u thuis rustig nalezen.

Leefregels na de behandeling

- Na de behandeling kan de urine wat rood of bloederig zijn. Drink daarom ongeveer 2 liter op een dag.
- Bij sommige patiënten werkt de botox zó goed dat zij tijdelijk niet goed kunnen plassen. Dan is het nodig om meerdere keren per dag zelf te katheteriseren.
- U heeft op de polikliniek geleerd hoe u dit zelf kunt doen.
- Lukt dit niet of is het voor u geen optie? Dan krijgt u een katheter voor langere tijd. Meestal is dat voor 2 tot 4 weken.
- Na een tijdje raakt de werking van de botox uitgewerkt. Dan komt het vermogen om zelf te plassen langzaam terug.

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis?

- Als u plotseling hevige of aanhoudende buikpijn en paracetamol (4 keer per dag - om de 6 uur - 2 tabletten van 500 mg) helpt niet.
- Bij veel bloedverlies en als u grote bloedstolsels uitplast.
- Als u zichzelf moet katheteriseren en dit lukt niet.
- Als u kort na de behandeling koorts heeft boven de 38 graden, of langer dan 24 uur boven de 38,5 graden.

Controle

- U krijgt een telefonische afspraak na 2 weken om te bespreken hoe het gaat.
- Heeft u klachten die passen bij een blaasontsteking? Neem dan contact op met uw huisarts.
- Heeft u het idee dat uw blaas niet goed leeg plast? Bel dan met het ziekenhuis.

Vragen of problemen als u weer thuis bent?

Bel dan met de polikliniek Urologie (via het Klantcontactcentrum) via 075 650 1290
Maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 16.30 uur

Boven bovenstaande tijden kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp: 075 650 2600