

Wat is een Urolift?

Bij een Urolift plaatst de arts een dun implantaat met een anker in de prostaat. Dit duwt het teveel aan prostaatweefsel opzij. Het weefsel wordt niet weggehaald.


De arts voert de ingreep uit op de polikliniek Urologie. U krijgt een roesje of plaatselijke verdoving. In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit op de operatiekamer.

De ingreep is niet pijnlijk en duurt kort.

U wordt opgenomen op de dagopname en gaat meestal dezelfde dag naar huis.

Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

De arts schuift een behandelcystoscoop in de plasbuis (figuur 1).



Figuur 1

Via het werkkanaal van de scope brengt de arts het bandjespistool in.

Met een klein bandje trekt de arts de zijkwabben van de prostaat opzij.

De plasbuis wordt weer wijder en u plast makkelijker.

Vorbereiding, belangrijk!

- Lever 10 dagen voor de ingreep urine in voor een kweek.
- Als de kweek bacteriën laat zien, krijgt u van de arts antibiotica.
- Is de urine schoon? Dan krijgt u geen bericht.
- U moet nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf 0.00 uur 's nachts niet meer mag eten, drinken of roken.
- Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit vooraf aan de uroloog en de anesthesist.

Stop op tijd met de volgende medicijnen (zie volgende pagina):

- 7 dagen vooraf: Ascal, Carbasalaatcalcium, Aspirine, Acetylsalicylzuur, Persantin, Plavix
 - 5 dagen vooraf: Marcoumar (Fenprocoumon)
 - 3 dagen vooraf: Acenocoumarol (Sintrom)
 - 2 dagen vooraf: Apixaban (Eliquis), Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa), Edoxaban (Lixiana)
- Soms mag u niet stoppen met bloedverdunners. Dit bespreekt de uroloog met u.
 - Bent u niet gestopt volgens deze regels? Dan gaat de behandeling niet door.

Dagopname

- U wordt opgenomen op de dagopname.
- Als u aan de beurt bent, brengt men u met bed naar de polikliniek Urologie.
- U krijgt een roesje.
- Na afloop gaat u terug naar de dagopname.
- U krijgt soms een katheter. Deze wordt verwijderd als de urine helder is.
- U mag naar huis als u zich goed voelt, tenzij u moet wachten op de uroloog of een nacht moet blijven.
- U mag niet zelf rijden. Regel vervoer van en naar het ziekenhuis.
- Blijf de eerste nacht niet alleen thuis. Zorg dat iemand bij u is of logeer ergens.

Na de ingreep

- Het is normaal dat er bloed zit in urine en sperma.
- U krijgt zo nodig een recept voor pijnstillers.
- U mag maximaal 4 keer per dag 1000 mg paracetamol of de voorgeschreven pijnmedicatie nemen.
- Begin pas weer met bloedverdunners als de urine 24 uur helder is.
- Blijft er veel bloed met stolsels in uw urine? Bel dan de poli Urologie of de Spoedeisende Hulp van het ZMC.

Voorkomen van een nabloeding

- Doe de eerste week geen zwaar werk of zware klussen. Span uw buikspieren niet.
- Fiets niet in de eerste 2 tot 4 weken. Autorijden mag wel.
- Sport niet in de eerste 2 weken. Wandelen mag wel.
- Heb geen seks en kom niet klaar in de eerste 2 weken. Zit er bloed bij het sperma en heeft u pijn? Wacht dan nog 2 weken.

Uw afspraken op een rijtje:

- U wordt verwacht op dagopname Noord 4.1
op (datum) om uur.
- Lever 10 dagen van tevoren urine in bij het laboratorium.
- Twee weken na de ingreep belt verpleegkundige specialist mw Proost u
op (datum) in de ochtend / middag.
- Controle op de polikliniek op (datum) om uur.

Wilt u controleren of onderstaande gegevens nog kloppen?

(patiënten sticker)

Vragen?

Bel ons via 075 650 12 90.