

Doel van het onderzoek

U krijgt een röntgenonderzoek van de urinewegen. Hiermee kan de oorzaak van uw klachten vastgesteld worden. Bij dit onderzoek worden de blaas en de urineleiders zichtbaar gemaakt met een jodiumhoudend contrastmiddel.

Vorbereiding

- U heeft ter voorbereiding een antibioticakuur gekregen. Volg de hierbij horende instructies nauwkeurig op.
- Trek makkelijke kleding aan en laat sieraden thuis als dat mogelijk is.
- Neem eventueel een T-shirt mee om tijdens het onderzoek te dragen.

Zwangerschap

Bij zwangerschap maken wij liever geen röntgenfoto's. Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Neem dan contact op met uw behandelend arts of met de afdeling Radiologie. Twijfelt u of u zwanger bent? Dan helpt het om te weten dat u alleen de eerste 10 dagen na de eerste dag van uw menstruatie zeker niet zwanger bent.

Menstruatie

Het onderzoek wordt bij voorkeur niet uitgevoerd tijdens de menstruatie, dit om infecties te voorkomen.

Medicijngebruik

U mag uw medicijnen gewoon innemen.

Het onderzoek

Een radioloog doet het onderzoek met hulp van een radiodiagnostisch laborant.

- Voor het onderzoek moet u uw onderkleding en eventueel uw BH uitdoen. Een meegebracht T-shirt mag u aanhouden.
- De urine-uitgang wordt gedesinfecteerd. Daarna brengt de radioloog via de urine-uitgang een dun slangetje (= katheter) in de blaas. Via deze katheter wordt er langzaam een contrastmiddel in de blaas gebracht.
- Tijdens het inbrengen van het contrastmiddel wordt de blaas zichtbaar op een beeldscherm met behulp van röntgenstraling.
- De radioloog maakt röntgenopnames in verschillende richtingen en van verschillende fases van vulling.
- Als de blaas vol is, wordt de katheter verwijderd.
- U moet het contrastmiddel uitplassen in een fles of een opvangbakje op de röntgentafel. Tijdens het plassen worden er röntgenopnames gemaakt zodat ook het verloop van de urine-uitgang zichtbaar wordt.
- Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

U kunt direct na het onderzoek naar huis of uw werk/school. De urine voelt soms de eerste paar keer bij het plassen nog wat plakkerig aan. Dit komt door het ingebrachte contrastmiddel en verdwijnt vanzelf. Soms treedt er na het onderzoek een blaasontsteking op.

Neem contact op met uw behandeld arts, huisarts of de afdeling Radiologie als u in de dagen na het onderzoek één of meerdere van de volgende symptomen heeft:

- pijn bij het plassen
- een branderig gevoel
- vieze urine
- bloed bij de urine
- koorts
- pijn in de flanken

De uitslag

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt de uitslag bespreekt deze met u.

Vragen?

Bel tijdens kantooruren met de afdeling Radiologie op 075 650 1310.