

Tijdens uw opname is een JJ-splint in uw urineleider geplaatst. De urineleider verbindt de nier met de blaas. De JJ-splint heeft een krul in de nier en een krul in de blaas om op zijn plaats te blijven.

Klachten door de JJ-splint

U kunt last hebben van:

- Bloed in uw urine.
- Is de splint geplaatst vanwege nierstenen? Dan kunt u nog nierstenen of steentjes uitplassen, wat soms pijn kan geven.
- Druk in de nier tijdens het plassen, omdat urine via de splint kan terugstromen.
- Vaker plassen en een zeurend of drukkend gevoel in de onderbuik.

Belangrijk: Drink voldoende vocht, 1,5 tot 2 liter per dag. Dit helpt bij een goed herstel.

Medicatie

U heeft mogelijk een recept gekregen voor Oxybutinine (3 keer per dag 5 mg). Dit medicijn maakt de blaas rustiger en kunt u zo nodig gebruiken. Mogelijke bijwerkingen zijn een droge mond en obstipatie.

Wanneer contact opnemen?

Bel de polikliniek Urologie als u:

- Koorts krijgt boven 38.5 °C.
- Klachten heeft die niet minder worden of verdwijnen door de medicatie.

Controleafspraak

Bij uw ontslag heeft u een afspraak gekregen voor controle op de polikliniek Urologie. De JJ-splint kan maximaal 3 maanden blijven zitten.

Contact na uw ontslag

Neem bij vragen of klachten contact op met de polikliniek Urologie via het Klantcontactcentrum op nummer **075 650 1290**.

Maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.

Na 17.00 uur kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op nummer **075 650 2600**