

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling cardiologie. U wordt 30 minuten voor de afgesproken tijd gevraagd zich te melden bij de balie op de 2e etage, locatie 2.12. U wordt opgehaald door een verpleegkundige.

Vorbereiding

Tijdens het onderzoek mag er geen voedsel in de maag zijn. U mag daarom tot 6 uur voor het onderzoek uw medicijnen innemen en iets lichts eten; een wit broodje of beschuitje met jam en een kopje thee. Daarna mag u niets meer eten en drinken tot het onderzoek.

Het onderzoek

Er wordt door de verpleegkundige een infuus geplaatst in een ader van de arm. De slokdarnecho wordt uitgevoerd door de cardioloog in samenwerking met de echocardiografist. Als u een gebitsprothese of een plaatje heeft, wordt u gevraagd dit te verwijderen. Bij een slokdarnecho kijkt een cardioloog met een buigzame slang vanuit de slokdarm naar het hart. U krijgt een bijtring ter bescherming van de slang. Tijdens de slokdarnecho krijgt u via het infuus een lichte verdoving, een roesje. Door het roesje voelt u zich meer ontspannen. U ligt op uw linkerzij als de arts de slang via uw keel naar de slokdarm brengt. Op de slang zit een verdovende gel. Vanuit de slokdarm zijn de structuren van het hart beter zichtbaar, de werking van de hartspier en de kleppen van het hart worden bekeken.

Na het onderzoek

Na het onderzoek verblijft u op de afdeling cardiologie totdat u weer goed wakker bent. Een uur na het onderzoek mag u een paar slokjes water nemen. Gaat het slikken niet goed? Dan moet u een kwartier wachten en kunt u opnieuw een paar slokjes water nemen. Gaat het slikken goed, dan kunt u weer eten. Na het onderzoek mag u de eerste 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer en geen gevaarlijke machines besturen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 20-30 minuten. Na het onderzoek verblijft u nog ongeveer 1,5 uur op de afdeling.

Uitslag

De cardioloog beoordeelt uw echo. Uw behandelend cardioloog zal de bevindingen met u bespreken tijdens uw eerstvolgende polikliniekbezoek.

Mogelijke complicaties

Een slokdarmecho is een veilig onderzoek met weinig risico's. In zeer zeldzame gevallen komen er complicaties voor, zoals beschadiging van het slijmvlies van de keelholte/slokdarm met wat bloedverlies tot gevolg. Ook kunt u last krijgen van slikklachten door de verdoving.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze informatie en/of onderzoek nog vragen hebben dan kunt u (via het Klantcontactcentrum) bellen naar het Hartvaatcentrum op telefoonnummer 075 650 13 00.